

Folleto informativo sobre educación sanitaria

De las enfermeras para usted

Guía de buenas prácticas
en enfermería

Usted y su vía intravenosa

¿Sabía usted que más del 90% de los pacientes en el hospital necesitarán una terapia intravenosa?

¿Qué es la terapia intravenosa?

La terapia de perfusión también se conoce como terapia intravenosa o IV. Es una manera de administrar a una persona líquidos, medicamentos, alimentación o sangre o productos derivados de la sangre utilizando tubos llamados “catéteres”. La terapia intravenosa puede durar tan poco como unos días y tanto como varios meses, dependiendo de su salud.

El catéter se puede insertar en su vena:

- De la mano.
- De los brazos.
- Del tórax.

La terapia IV se puede utilizar en recién nacidos, niños y adultos en:

- Hospitales.
- Clínicas.
- Centros de cuidados a pacientes crónicos, residencias.
- En la comunidad.

Tipos de terapias intravenosas

Su enfermera hablará con usted, su familia y sus cuidadores sobre los tipos de dispositivos intravenosos que se usarán en su plan de cuidados. Su enfermera puede ayudarle a decidir cuál es el mejor dispositivo para usted.

Esta elección dependerá del tratamiento que usted reciba, la duración de su tratamiento, su salud, su historial médico y quién se ocupará del cuidado durante ese tiempo. Elegir el mejor dispositivo para usted puede garantizar mayor comodidad, una estancia hospitalaria más corta, menos visitas a urgencias y la reducción de los costes de la atención sanitaria. Utilizando el mejor dispositivo también se reducen los problemas y previenen las lesiones de las venas en los brazos y las manos.

¿Qué necesito saber antes de que me coloquen una vía intravenosa?

Para prevenir infecciones su enfermera deberá:

- Lavarse las manos.
- Valorar su riesgo de infección.
- Examinar a su familia y amigos en busca de enfermedades para protegerle de posibles contagios.
- Lavar su piel con limpiadores especiales antes de colocarle un catéter.

- Limpiar alrededor del catéter y cambiar los apósitos a menudo.
- Enseñarle a usted y a aquellos que le cuidan, cómo encargarse del catéter si a usted se le va a administrar terapia intravenosa en casa.

Su equipo de salud guiará su plan de terapia intravenosa:

- Ayudándole a seleccionar el mejor dispositivo intravenoso para usted.
- Conociendo los fármacos que está tomando.
- Consultando con usted, de manera frecuente, cómo va el tratamiento y su progreso, para mejorar su salud.

¿Qué debe buscar si posee un catéter intravenoso?

Si usted está en el hospital, es importante que le diga a su enfermera o cuidador, lo antes posible, si advierte lo siguiente:

- Si el apósito está empapado de sangre o de líquido claro.
- Si el apósito se ha despegado.
- Si el área de alrededor del catéter está inflada o hinchada.
- Si el área de alrededor del catéter está roja o con dolor.
- Si la bolsa está vacía.
- Si el sistema de perfusión se ha desconectado.
- Si está conectado a un bomba de perfusión y la bomba está pitando o la luz de batería baja está encendida.

Si a usted se le está administrando terapia intravenosa en casa, su enfermera le enseñará a usted o a su cuidador qué hacer si surgen problemas con su terapia intravenosa o su bomba de perfusión.

Si usted tiene arritmias o problemas para respirar es importante que usted reciba ayuda médica de forma rápida. Llame a su enfermera o su cuidador si está en un centro sanitario o llame al 112 si se encuentra en otro lugar.



La intención de esta hoja informativa es involucrarle a usted en las decisiones que afecta a su salud. Puede descargar, gratuitamente, esta hoja informativa de nuestro website. Para saber más acerca de nuestras hojas informativas y guías, por favor visite: www.rnao.org/bestpractices.



Registered Nurses' Association of Ontario
Nursing Best Practice Guidelines Program
158 Pearl Street
Toronto, Ontario M5H 1L3
Website: www.rnao.org/bestpractices

*This program is funded by the
Government of Ontario*