

ESCALA NISSH



1A. Nivel de Conciencia

- 0 Alerta.
- 1 Somnolencia. No esta alerta pero reacciona con estimulación mínima para obedecer o responder.
- 2 Estuporoso. No esta alerta, precisando una estimulación repetida para reaccionar.
- 3 Coma. Solo respuestas reflejas o falta total de respuestas.

1B. ¿Mes que estamos y Edad?

- 0 Ambas respuestas son correctas
- 1 Una respuesta correcta
- 2 Ambas respuestas incorrectas

1C. Cierre y apertura de ojos y mano no parética

- 0 Ambos movimientos son correctos
- 1 Un movimiento correcto
- 2 Ambos movimientos incorrectos

2. Movimiento ocular. Mirada conjugada (solo movimientos horizontales)

- 0 Normal.
- 1 Parálisis parcial (si tiene mirada desviada pero corrige de manera voluntaria).
- 2 Paresia total o desviación forzada. Desviación oculocefálica.

3. Test de campo visual

- 0 Sin pérdida de campo visual.
- 1 Hemianopsia parcial.
- 2 Hemianopsia completa.
- 3 Ceguera total.

4. Parálisis facial

- 0 Movimientos normales y simétricos
- 1 Parálisis menor: labio superior flácido, asimetría en la sonrisa.
- 2 Parálisis parcial facial: casi total en la parte inferior de la cara
- 3 Parálisis completa en uno o ambos lados: ausencia de movimiento en la parte superior o inferior de la cara.

5. Función motora de los brazos

- 0 No hay caída: mantiene la posición durante 10sg.
- 1 Caída progresiva en <10sg. Sin llegar a caer todo.
- 2 Caída del todo en <10sg. Se observa cierto esfuerzo contra la gravedad.
- 3 Caer totalmente sin evidencia de esfuerzo contra la gravedad.
- 4 No hay movimiento.
- 0 Amputación del miembro o inmovilización de articulación

6. Función motora de las piernas

- 0 No hay caída: mantiene la posición durante 5sg.
- 1 Caída progresiva durante 5sg sin llegar a caer del todo
- 2 Cae del todo en <5sg pero hay cierto esfuerzo contra la gravedad.
- 3 Cae totalmente sin evidencia de esfuerzo.
- 4 No hay movimiento.
- 0 Amputación del miembro o inmovilización de articulación.

7. Dismetría

- 0 Ausente o déficit motor que impide la valoración.
- 1 Dismetría de un miembro.
- 2 Dismetría en ambos miembros.
- 0 Amputación del miembro o inmovilización de la articulación.

8. Sensibilidad

- 0 Normal: no hay pérdida de sensibilidad
- 1 Pérdida débil o moderada: nota el contacto, pero no percibe si es con la punta o con el lado plano de la aguja.
- 2 Pérdida total: no nota el contacto de forma bilateral.

9. Lenguaje

- 0 Normal, sin afasia
- 1 Leve o moderada: dificultad de habla y/o comprensión, pero se identifica lo que quiere decir.
- 2 Grave: sólo comunicación mínima y es muy difícil identificar lo que quiere decir.
- 3 Global, mutismo: no habla ni comprende

10. Disartría

- 0 Articulación normal
- 1 Ligera o moderada: se entiende con dificultad
- 2 Severa: Casi imposible entender las palabras/no habla
- 0 Intubado o hay otra dificultad física para hablar

11. Extinción (supresión, Inatención) Negligencia

- 0 No hay anomalías
- 1 Extinción frente a estimulación bilateral simultánea o negligencia en unas de las modalidades sensoriales visuales, táctiles, auditivas, espaciales o corporales.
- 2 Hemi-inatención o negligencia grave frente a más de un estímulo. No reconoce su propia mano o solo reconoce una parte del espacio.

A) Realizar antes de la administración de tratamiento vía oral o ingesta oral.

B) Preparación del paciente:


- Información y valoración (alerta, colaboración, movilidad lengua, cara...)
- Posición: Bien incorporado o en sedestación.
- Colocación pulsioxímetro.
- Pedirle que hable para tener referencia de la voz.

C) Material:


- Agua y espesante comercial.
- 3 vasos (distintas viscosidades)
- Jeringa de 50 ml
- Pulsioxímetro.
- Hoja registro.
- Recomendado: Sistema de aspiración

D) Realización del Test


1º Textura NECTAR



2º Textura LIQUIDA



3º Textura PUDING



F) Tras cada toma valorar:

a. Parámetros de seguridad:

- Tos.
- Desaturación de O2 (> ó = al 3% respecto a basal)
- Cambio en el tono de la voz.

b. Parámetros de eficacia:

- Presencia de residuos orales.
- Deglución fraccionada
- Fallo del sello labial
- Presencia de residuos faríngeos